PLANCTON

Principais grupos. Critérios de classificação

Distribuição e relação com os factores físico-químicos e biológicos

Distribuição horizontal

Distribuição vertical

Microdistribuição

Relação inversa

Migrações

Transferência de matéria e energia e DSL

Métodos de medida da produção planctónica

Estações oceânicas

Variações sazonais. Exemplos

DESIGNAÇÕES RELATIVAS AOS GRUPOS DE ORGANISMOS E AO MEIO AQUÁTICO

PLANCTON - DIVISÕES CLÁSSICAS E MENOS CLÁSSICAS

PLANCTON

DIMENSÕES DOS ORGANISMOS

Ultra-nano
(Pico)

Nano

Micro

Macro

Mega

ultrananoplankton (bacterioplankton) <2µm
nanoplankton (phytoplankton) 2 – 20µm	<p><i>Thalassomonas</i> <i>Gymnodinium</i> <i>Coccolithus</i> (a coccolithophore)</p>
micro phytoplankton 20 – 200µm	<p><i>Ceratium</i> (dinoflagellate) <i>Bidulphia</i> (diatom) <i>Nitzschia</i> (diatom)</p>
microzooplankton (herbivores)	<p><i>Tintinnopsis</i> (ciliate) <i>Plectacantha</i> (radiolarian)</p>
macroplankton (zooplankton) 200 – 2000µm (herbivores and carnivores)	<p><i>Globigerina</i> (Foraminifera) copepods <i>Cirripede nauplii</i></p>
megaplankton >2000µm (carnivores)	<p><i>Sagitta</i> (Chaetognatha) <i>Euphausiid</i> (Crustacea) <i>Sarsia</i> (coelenterate) Whiting larva (teleost) <i>Pleurobrachia</i> (ctenophore)</p>

AMOSTRAGEM

GARRAFAS

REDES

PLANCTON - DIMENSÕES E BIOMASSA

BIOMASSA E CLOROFILA
(Pacífico tropical)

Picoplancton (<math><2\mu\text{m}</math>)
39-63%

Nanoplancton (2-20μm)
27-42%

Microplankton (20-200μm)
9-16%

Contribuição dos principais grupos funcionais para a biomassa
(n° indiv x volume esférico equivalente)

PLANCTON - DIMENSÕES E ABUNDÂNCIA

Mediterrâneo: abundância relativa de organismos de diferentes tamanhos
(Rodríguez, 1994)

**PICO-
NANO- e
MICROPLANCTON**

<2µm

Prochlorococcus sp.

Microflagelados

2-20µm

Cocolitoforídeo

Diatomáceas

20-200µm

Dinoflagellates

Dinoflagelados

Radiolário

Foraminífero

Ciliado

Tintínídeo

Diatomáceas

Dinoflagelados

Fitoplancton

SCIENCE PHOTO LIBRARY
いろいろ

ZOOPLANCTON

Copépodes (Crustacea)
geralmente dominantes

Di Caspita SZM ©

HOLOPLANCTON

PLANCTON - VIVER NA COLUNA DE ÁGUA

ADAPTAÇÕES À VIDA PELÁGICA

Flutuabilidade

Aumento da relação superfície:volume

Morfologia do corpo, ramificação dos apêndices, presença de sedas, organização em colônias

Diminuição do peso específico

Regulação fisiológica (flutuadores de pressão variável, inclusões lipídicas, controlo iónico, vacuolização)

Espessura das conchas e frústulas

Transparência (homocromia)

Bioluminescência

PLANCTON

Velocidade de afundamento de partículas e organismos

Grupo	Velocidade, m d ⁻¹
FITOPLANCTON	
Células vivas	0 - 30
Células mortas	<1 - 510
Fragmentos	1500 - 26000
ZOOPLANCTON	
Foraminíferos	30 - 4800
Radiolários	350
Quetognatas	435
Copépodes	36 - 720
Pterópodes	760 - 2270
Salpas	165 - 253
Fezes	36 - 376
Ovos de Peixe	215 - 400

(modificado de Parsons & Takahashi, 1973)

PENETRAÇÃO DA LUZ NA ÁGUA

PIGMENTOS ACESSÓRIOS - ADAPTAÇÃO FISIOLÓGICA ÀS CONDIÇÕES DE MISTURA TURBULENTA E AO AFUNDAMENTO.

Pigmentos Absorção

C l a , b e c
 Ficoxantinas
 Ficoeritrinas
 Ficocianinas

ESPECTRO DE ABSORÇÃO DOS PIGMENTOS PRESENTES EM DIFERENTES PRODUTORES PRIMÁRIOS

Flutuabilidade

Transparência (homocromia)

Bioluminescência

Blooms

FITOPLANCTON BLOOMS

Marés vermelhas

Foraminíferos

Foraminíferos e clima

Radiolários

SiO₂

Ernst Haeckel

x250

Distribuição espacial

Horizontal

Vertical

Relação com a hidrografia

UPWELLING E DIVERGÊNCIA

SISTEMAS DE UPWELLING COSTEIRO:

A - Peru; B - Corrente da Califórnia;
C - NW África; D - SW África

NUTRIENTES DISTRIBUIÇÃO DE NITRATO À ESCALA GLOBAL

FITOPLANCTON DISTRIBUIÇÃO DA PPL À ESCALA GLOBAL

BIOMASSA FITOPLANCTÓNICA (CLOROFILA)

ATLÂNTICO NORTE
(INVERNO)

Chlorophyll a Concentration
mg/m³

<http://daac.gsfc.nasa.gov>

ZOOPLANCTON - ATLÂNTICO NORTE

Distribuição horizontal e relação com a hidrografia

ECOSSISTEMAS PLANCTÓNICOS SUBTROPICAIS

Características:	Upwelling costeiro	Divergência equatorial	Giro central
Velocidade vertical (cm s^{-1})	10^2 - 10^3	10^3 - 10^4	10^4 - 10^5
$\text{NO}_3\text{-N}$ ($\mu\text{g at l}^{-1}$)	20-30	20-30	0-5
Produção primária ($\text{gm}^{-2}\text{d}^{-1}$)	1-10	1-5	0,1-0,5
Fitoplancton ($\text{mgC mgCl}^{-1}\text{h}^{-1}$)	60-180	45-90	15-30
Dimensão das células	grandes		pequenas
Biomassa média dos herbívoros ($\mu\text{gC ind}^{-1}$)	40-100	4-40	4-40
Mobilidade dos herbívoros	alta	baixa	+baixa
Variabilidade temporal dos herbívoros	alta	baixa	+baixa
Níveis tróficos	1-2	3-4	5-6
Produção no topo	alta	intermédia	baixa

(Adaptado de Walsh, 1976)

BACTERIOPLANCTON

Distribuição vertical de bactérias decompositoras
(Oceano aberto)

FITOPLANCTON Distribuição vertical de clorofila (mg m^{-3})

TEMPERATURA – DISTRIBUIÇÃO VERTICAL PERFIL DO OCEANO ATLÂNTICO

ZOOPLANCTON - DISTRIBUIÇÃO VERTICAL OCEANO PACÍFICO

MICRODISTRIBUIÇÃO (PATCHINESS)

Causas da microdistribuição:

- **Mecanismos físicos**
 - Circulação e turbulência à escala regional (ventos)
 - Condições de fronteira, gradientes de luz, temperatura, salinidade
- **Mecanismos sociais e demográficos**
 - Taxas de reprodução
 - Associação em grupos móveis (protecção, reprodução)
- **Mecanismos fisiológicos e comportamentais relacionados com o consumo de recursos**
 - Heterogeneidade da distribuição de recursos (nutrientes, alimento)
 - Diferentes respostas numéricas
 - Competição interspecífica

MICRODISTRIBUIÇÃO

ESCALA REGIONAL / LOCAL

Upwelling costeiro

O ciclo diário de **aquecimento e arrefecimento** das massas de água gera células de convecção que movimentam o plancton

Estuários

Estratificação

Topografia
Formação de termoclinas,
nutriclinas...

Mistura -
gradiente de
salinidade

Circulação de Langmuir

Vento superficial ($>3\text{ms}^{-1}$)
origina a circulação de
Langmuir, com zonas
alternadas de divergência e
convergência

MICRODISTRIBUIÇÃO

Mecanismos físicos - Relação com a hidrodinâmica

Vórtices de Langmuir

- A - flutuabilidade neutra (ao acaso)
- B - flutuabilidade negativa (agregação em upwelling)
- C - flutuabilidade positiva (agregação em downwelling)
- D, E, F - agregação nadando contra a corrente (relação com a luz)

FITOPLANCTON

Mecanismos fisiológicos e comportamentais relacionados com o consumo de recursos

Produção primária e microdistribuição

- Biomassa (mg Cl a m^{-3})
- Taxa de fotossíntese ($\text{mg C mg Cl a d}^{-1}$)

FACTORES: Luz
Nutrientes
Taxa de crescimento

ESTRATIFICAÇÃO / MICRODISTRIBUIÇÃO

FITOPLANCTON

Mecanismos fisiológicos e comportamentais relacionados com o consumo de recursos

VARIAÇÃO DOS PERFIS DE BIOMASSA (mg Cl a m⁻³)

<http://botany.uwc.ac.za>

RELAÇÃO INVERSA

● fito
☞ zoo

Retorno à relação inversa

MIGRAÇÕES VERTICAIS

- As migrações verticais do zooplankton surgem em resposta a:
- Condições físico-químicas do meio (luz, temperatura, correntes)
 - Preferências alimentares
 - Evitamento de predadores
 - Estratégias reprodutivas
 - Comportamento social

MIGRAÇÕES NICTEMERAIS

MIGRAÇÕES NICTEMERAIS

Varição com o estado de desenvolvimento dos organismos

Loch Fyne, Escócia

Migrações verticais

- Estímulo principal – luz
- Temperatura - as migrações diárias ocorrem principalmente em áreas estratificadas

Possíveis razões:

- Evitar predadores
- Evitar os UV
- Mudar a posição na coluna de água, de modo a aumentar a produção e conservar energia
- ... várias combinações de factores podem estar na sua origem

MICRODISTRIBUIÇÃO

Mecanismos sociais e demográficos

Associação em grupos móveis (protecção, reprodução)

Eufasiáceo (krill)

Misidáceo

Aurelia sp.

NATIONAL GEOGRAPHIC
Photograph by David Doubilet
© COPYRIGHT NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY. ALL RIGHTS RESERVED.

MICRODISTRIBUIÇÃO - ESCALAS

Microdistribuição em **larga escala** - 3 Km

Microdistribuição em **pequena escala** - distância mínima entre manchas detectadas 14m

Zooplankton em registo contínuo (Wiebe, 1970)

MICRODISTRIBUIÇÃO: ESCALAS: 10^5 m a 10^{-1} m VARIABILIDADE NO ESPAÇO

Zooplankton - arrasto sup.

CONSEQUÊNCIAS ECOLÓGICAS DA MICRODISTRIBUIÇÃO

- **Agregação e alimento** – a resposta agregada dos predadores a elevadas densidades de presas traduz-se numa maior **eficiência de predação** e na **redução do risco de ser comido**, mesmo que possa atrair predadores
- **Efeitos demográficos** - a baixa turbulência pode promover a microdistribuição de presas e a frequência dos encontros. Turbulência elevada é prejudicial para o **crescimento e reprodução**
- **Uso e selecção do habitat** - os organismos seleccionam manchas diferentes consoante os recursos nelas presentes
- **Organização social** - quando a competição é do tipo interferência (contest) as manchas **mais favoráveis** são ocupadas primeiro. Indivíduos excedentes tenderão a utilizar áreas **menos favoráveis** (efeitos demográficos)
- **Dispersão** - muitos indivíduos percorrem distâncias curtas numa mesma mancha; poucos indivíduos percorrem distâncias longas de uma mancha para outra. A **distribuição espacial** das manchas e a frequência de alterações que estas sofrem afectam a **necessidade ou as vantagens da dispersão** a longas distâncias